

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Hubungan Tekanan Darah dan Kadar Leukosit Saat Awal Rawatan dengan Kejadian Nyeri Kepala Pasca Stroke Iskemik di RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah Batusangkar” maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sebagian besar pasien stroke iskemik berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia yaitu 62 tahun.
2. Sebagian besar pasien stroke iskemik mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi saat awal rawatan.
3. Sebagian besar pasien stroke iskemik mengalami leukositosis saat awal rawatan.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan darah dengan nyeri kepala pasca stroke iskemik.
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar leukosit dengan nyeri kepala pasca stroke iskemik

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan disarankan untuk :

1. Setiap pasien stroke iskemik yang dirawat dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan bagi instalasi rekam medik rumah sakit untuk lebih memperhatikan kelengkapan data rekam medik.
2. Setiap pasien pasca stroke iskemik dianjurkan melakukan kontrol ulang agar dapat dilakukan pemeriksaan nyeri kepala pasca stroke iskemik.
3. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri kepala pasca stroke iskemik.