

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik pasien katarak senilis di Rumah sakit Universitas Andalas yang terbanyak adalah pasien berusia 65-74 tahun dan berjenis kelamin perempuan serta jenis katarak paling banyak yang diderita oleh pasien adalah katarak nuklear.
2. Jenis katarak senilis berdasarkan klasifikasi WHO yang memiliki sensitivitas kontras paling rendah sebelum operasi fakoemulsifikasi adalah subkapsular posterior dan jenis katarak yang memiliki sensitivitas kontras paling tinggi sebelum operasi fakoemulsifikasi adalah nuklear kortikal.
3. Operasi katarak dengan metode fakoemulsifikasi berpengaruh terhadap peningkatan nilai sensitivitas kontras pasien katarak senilis.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran berupa:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan pengukuran cahaya ruangan sehingga bisa mengetahui cahaya ruangan sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan sensitivitas kontras.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan pengukuran diameter pupil pasien sehingga bisa melakukan evaluasi bagaimana pengaruh diameter pupil pasien terhadap sensitivitas kontras.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan beberapa jenis desain IOL yang berbeda sehingga bisa mengetahui jenis IOL mana yang paling bagus dalam meningkatkan *visual function* ataupun *visual acuity* seseorang