

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang “Gambaran Kejadian *Enamel Defect* pada Anak *Stunting* Usia 6 – 10 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Kilangan” adalah tipe *enamel defect* yang dominan terjadi pada anak *stunting*, yaitu *opacity* berbatas jelas.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Pemeriksaan klinis *enamel defect* sebaiknya tidak hanya dilakukan pada gigi insisivus permanen saja, melainkan juga pada gigi insisivus desidui, karena beberapa anak usia 6 – 7 tahun masih memiliki gigi insisivus desidui. Hal ini bertujuan jika *enamel defect* terdeteksi lebih awal pada gigi insisivus desidui maka perawatan preventif dapat dilakukan untuk mencegah kejadian *enamel defect* pada gigi insisivus permanen.
2. Orang tua terlibat menjadi responden untuk memberi informasi mengenai status gizi masa lalu subjek penelitian, sehingga kemungkinan penyebab *stunting* dan *enamel defect* dapat diketahui dan perawatan dapat dilakukan untuk mencegah keparahan dampak *stunting* dan *enamel defect*.