

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian terhadap anak *stunting* dan anak normal umur 10-12 tahun di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. - Angka kejadian keterlambatan erupsi gigi kaninus bawah permanen pada anak *stunting* lebih tinggi dibandingkan anak normal.
 - Anak *stunting* berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.
 - Nilai z-score anak *stunting* pada penelitian ini lebih dominan <-2 sebanyak 22 anak
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara *stunting* dengan keterlambatan erupsi gigi kaninus bawah permanen di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kilangan.

7.2.1 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

7.2.1 Bagi Sekolah

Perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada orang tua murid mengenai pentingnya mencegah *stunting* dan dampak dari *stunting* khususnya pada pertumbuhan

dan perkembangan gigi serta upaya meningkatkan kesadaran orang tua agar memperhatikan nutrisi pada anak agar tidak memengaruhi tumbuh kembang.

7.2.2 Bagi Pelaku Kesehatan

Dilakukan penyuluhan terhadap orangtua mengenai pentingnya nutrisi dan gizi pada anak serta pengaruhnya terutama terhadap pertumbuhan dan perkembangan gigi.

7.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat diharapkan melakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan keterlambatan erupsi gigi dengan faktor lain yang memengaruhi keterlambatan erupsi gigi.

