

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN  
PADA IBU HAMIL SELAMA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH  
KERJA PUSKESMAS CURUP KABUPATEN  
REJANG LEBONG BENGKULU**

**Penelitian Keperawatan Maternitas**



**MIWI YULIANTI**

**2011316007**

**Pembimbing Utama**

**Ns. Deswita, M.Kep, Sp.Kep.An**

**NIP. 197512252002122002**

**Pembimbing Pendamping**

**Ns. Ira Mulya Sari, M.Kep.,Sp.Kep.An**

**NIP. 198404132019032008**

**FAKULTAS KEPERAWATAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**JUNI 2022**

FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
JUNI 2022

Nama : Miwi Yulianti  
Nim : 2011316007

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecemasan Pada Ibu Hamil  
Selama Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Curup  
Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu

**ABSTRAK**

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan terhadap infeksi Covid-19 karena mengalami perubahan hormon dan emosional yang sangat drastis. Pandemi Covid-19 menyebabkan prevalensi kecemasan pada ibu hamil meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan pada ibu hamil selama pandemi Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Curup kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan desain *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan sampel berjumlah 128 ibu hamil. Analisis data yang digunakan adalah uji *Chi Square*. Hasil penelitian menunjukkan kecemasan sedang 67,2%, tingkat pendidikan rendah 78,1%, pendapatan rendah 69,5%, tidak bekerja 57%, tidak ada riwayat penyakit 75,8%, aktivitas sedang 65,6%, dukungan keluarga kurang 43%, dan pengetahuan kurang 43%. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik dengan kecemasan (*p-value* 0,004), dukungan keluarga dengan kecemasan (*p-value* 0,000), dan pengetahuan dengan kecemasan (*p-value* 0,000). Tidak terlihat adanya hubungan riwayat penyakit dengan kecemasan (*p-value* 0,634). Puskesmas pelayanan tingkat pertama melakukan skrining sebagai deteksi awal kecemasan dan pemberian edukasi dengan memanfaatkan teknologi, serta bagi ibu hamil dianjurkan melakukan aktifitas fisik seperti berlari kecil setiap pagi selama 25 menit.

Kata Kunci : Covid-19, Ibu Hamil, Kecemasan, Faktor-faktor  
Daftar Pustaka : 76 (2012-2022)

NURSING FACULTY  
ANDALAS UNIVERSITY  
JUNE 2022

Name : Miwi Yulianti  
Name : 2011316007

*Factors Associated with Anxiety in Pregnant Women During  
the Covid-19 Pandemic in the Curup Health Center Work  
Area Rejang Lebong Regency, Bengkulu*

**ABSTRACT**

*Pregnant women are one of the groups vulnerable to Covid-19 infection because they experience very drastic hormonal and emotional changes. The Covid-19 pandemic has caused the prevalence of anxiety in pregnant women to increase significantly. This study aims to determine the factors related to anxiety in pregnant women during the Covid-19 pandemic in the working area of the Curup Health Center, Rejang Lebong Regency, Bengkulu. This type of research is quantitative research using a cross sectional design. The sampling technique was purposive sampling with a sample of 128 pregnant women. Analysis of the data used is the Chi Square test. The results showed moderate anxiety 67.2%, low level of education 78.1%, low income 69.5%, not working 57%, no history of disease 75.8%, moderate activity 65.6%, lack of family support 43 %, and lack of knowledge 43%. There is a significant relationship between education level and anxiety (p-value 0.000), physical activity and anxiety (p-value 0.004), family support and anxiety (p-value 0.000), and knowledge and anxiety (p-value 0.000). There was no relationship between medical history and anxiety (p-value 0.634). The first-level health center carries out screening as an early detection of anxiety and provides education by utilizing technology, and pregnant women are recommended to do physical activities such as jogging every morning for 25 minutes.*

*Keywords : Covid-19, Pregnant Women, Anxiety, Factors  
Bibliography : 76 (2012-2022)*