

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada penelitian ini didapatkan subjek penelitian yang menderita leukemia lebih didominasi oleh anak laki-laki daripada anak perempuan dan leukemia sering terjadi pada anak usia 1-12 tahun.
2. Terdapat perbedaan skor *fatigue* sebelum dan sesudah diberikannya intervensi akupresur pada anak leukemia yang menjalani kemoterapi. Rata-rata skor *fatigue* setelah diberikan akupresur lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dilakukan akupresur
3. Pemberian akupresur sangat berpengaruh kuat dalam menaikan skor *fatigue* dan mengurangi *fatigue* pada anak dengan leukemia yang menjalani kemoterapi di RSUP Dr.M.Djamil Padang

B. Saran

1. Bagi RSUP Dr.M.Djamil Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan langsung sebagai intervensi dalam pemberian asuhan keperawatan pada anak dengan leukemia untuk mengatasi kemoterapi atau penyakit lainnya khususnya di ruangan IRNA anak kronis.

2. Bagi Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ajar tambahan di Fakultas Keperawatan, untuk mengoptimalkan asuhan keperawatan khususnya pada diagnosis keletihan dengan memasukan intervensi pemberian akupresur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya perlu mengembangkan intervensi lain yang bisa digunakan untuk penatalaksanaan untuk mengurangi *fatigue* disertai penggunaan desain penelitian *Randomized Controlled Trial* (RCT) dengan jumlah sampel yang lebih besar. Peneliti juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti lain untuk mengembangkan metode maupun jenis penelitian menggunakan terapi non farmakologi.

