

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Median kadar fibrinogen pada pasien DM tipe-2 yaitu 349,9(237,5-636,1) mg/dL. Median HbA1c pada pasien DM tipe-2 yaitu 7,2(5,4-12,3)%.
2. Median kadar fibrinogen plasma pada pasien DM tipe-2 dengan kontrol glikemik baik yaitu 332(237,5-530,1) mg/dL dan kadar fibrinogen plasma pada pasien DM tipe-2 dengan kontrol glikemik buruk yaitu 368(305,1-636,1) mg/dL.
3. Penelitian ini mendapatkan perbedaan kadar fibrinogen plasma pada pasien DM tipe-2 kontrol glikemik baik dengan pasien DM tipe-2 kontrol glikemik buruk.
4. Penelitian ini mendapatkan korelasi yang sedang antara kadar fibrinogen plasma dengan HbA1c pada pasien DM tipe-2.

7.2 Saran

1. Pemeriksaan fibrinogen secara berkala perlu disarankan untuk menilai faktor risiko kardiovaskular pada pasien DM tipe-2.
2. Pasien DM tipe-2 perlu mencapai kontrol glikemik yang baik karena kontrol glikemik yang buruk berpotensi untuk terjadi peningkatan kadar fibrinogen dan berisiko untuk kejadian kardiovaskular