

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penderita pemfigus vulgaris memiliki rasio jenis kelamin perempuan banding laki-laki 1 : 0,78, berada pada kelompok umur 40-60 tahun, dengan jenis pekerjaan terbanyak sebagai ibu rumah tangga, dan sebagian besar memiliki manifestasi klinis pada kulit dan membran mukosa.
2. Insiden diabetes melitus pada penderita pemfigus vulgaris adalah 6,25% dari total sampel.
3. Insiden hipertensi pada penderita pemfigus vulgaris adalah 50% dari total sampel.
4. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara diabetes dengan pemfigus vulgaris pada penderita PV pada penelitian ini.
5. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara hipertensi dengan pemfigus vulgaris pada penderita PV pada penelitian ini.

7.2 Saran

Diharapkan penelitian mengenai pemfigus vulgaris ke depannya dapat dilakukan dengan periode penelitian yang lebih panjang (>10 tahun) dibandingkan penelitian ini (5 tahun), dengan pertimbangan RSUP Dr. M. Djamil sudah mulai menggunakan rekam medis elektronik. Dengan periode yang lebih panjang maka akan didapatkan lebih banyak data, dan sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat. Selain itu dapat dilihat juga apakah insiden diabetes atau hipertensi akan meningkat pada penderita pemfigus vulgaris yang memakai kortikosteroid jangka panjang melebihi 5 tahun. Dengan begitu dapat dilihat apakah jangka waktu yang lebih panjang berpengaruh terhadap hubungan diabetes dan hipertensi dengan pemfigus vulgaris.