

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Terdapat penurunan rerata ketebalan RGC makula pada penderita POAG dengan defek lapangan pandang stadium *early* dan *moderate*.
2. Terdapat lebih banyak penurunan rerata ketebalan RNFL peripapil pada penderita POAG dengan defek lapangan pandang stadium *moderate* dibandingkan *early*.
3. Terdapat perbedaan rerata ketebalan RGC dan RNFL pada POAG dengan defek lapangan pandang stadium *early* dan *moderate* yang signifikan.

7.2 Saran

1. Pemeriksaan RGC makula dapat dipertimbangkan sebagai pemeriksaan pada pasien POAG stadium *early* sebagai pemeriksaan penunjang untuk membantu menegaskan diagnosis terhadap kelainan struktural, tanpa mengesampingkan pemeriksaan RNFL peripapil sebagai pemeriksaan tambahan.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan dan progresivitas kelainan RGC dan RNFL serta defek lapangan pandang pada POAG dengan rentang usia yang lebih luas.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggali faktor resiko lain yang bisa mempengaruhi RGC dan RNFL serta defek lapangan pandang.