

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Karakteristik subyek yang diperoleh pada pasien penelitian ini mayoritas adalah laki-laki dengan faktor resiko yang paling banyak yaitu merokok, namun tidak terdapat hubungan secara statistik antara faktor resiko PJK dengan kejadian KKM.
2. Pada pasien IMA-EST paska IKPP yang mengalami KKM selama rawatan diperoleh nilai rerata kadar eNOS yang lebih rendah daripada pada kelompok yang tidak mengalami KKM dengan nilai rerata eNOS pada pasien KKM 42.331 pg/ml.
3. Pada pasien IMA-EST paska IKPP terdapat hubungan bermakna antara kadar eNOS dengan KKM, dimana semakin rendah kadar eNOS maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya KKM dengan koefisien korelasi sedang, dimana nilai koefisien korelasi $-0,516$ dan $p=0,001$.

6.2. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menjadikan eNOS sebagai prediktor terjadinya KKM pada pasien IMA – EST.
2. Dengan menghitung kadar eNOS diharapkan dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya KKM.
3. Untuk penelitian lanjutan mungkin dapat dilakukan pemeriksaan eNOS sebelum dan sudah Tindakan IKPP untuk menilai respon terapi.