

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pada kejadian rinosinusitis kronik disertai polip lebih banyak dibandingkan rinosinusitis kronik non polip.
2. Koloni bakteri gram positif yang paling sering ditemukan pada RSK polip dan non polip adalah *Staphylococcus epidermidis*, bakteri gram negatif yang sering ditemukan pada RSK polip adalah *Klebsiella sp.* dan RSK non polip adalah *Pseudomonas aeruginosa*.
3. Pada pasien RSK Polip sebagian besar dari jenis bakteri gram positif masih sensitif terhadap antibiotik gentamisin dan eritromisin, dari jenis bakteri gram negatif adalah meropenem. Pada RSK non polip dari bakteri gram positif masih sensitif terhadap antibiotik gentamisin dan bakteri gram negatif terhadap meropenem.
4. Pada rinosinusitis kronik sering terjadi pada pasien laki-laki dengan rentang usia >40-50 sebanyak 20 pasien .

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah ditulis oleh peneliti, peneliti menyarankan untuk dapat mempertimbangkan kondisi pasien dalam pemberian antibiotik jika pasien telah diizinkan pulang dikarenakan banyaknya kejadian resistensi antibiotik pada kasus rinosinusitis kronik saat ini.