

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Perbandingan Lama Rawatan Pasien *Sectio Caesarea* Metode ERACS dengan Metode Konvensional di RSIA Restu Ibu Padang”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Data penelitian lama rawatan pada pasien *sectio caesarea* yang ditindak dengan metode konvensional menunjukkan paling banyak pasien dirawat inap selama lebih dari atau sama dengan 3 hari.
2. Data penelitian lama rawatan pada pasien *sectio caesarea* yang ditindak dengan ERACS menunjukkan paling banyak pasien dirawat inap selama 2 hari.
3. Terdapat hubungan yang bermakna pada perbandingan lama rawatan antara metode ERACS dengan metode konvensional.

#### **7.2 Saran**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk meninjau aspek lain dalam perbandingan antara metode ERACS dan metode konvensional pada kasus *sectio caesarea* dengan data yang didapatkan dari penelitian multisenter.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang serta dapat dijadikan data pembandingan bagi peneliti selanjutnya.