

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

7.1.1 Kadar hormon paratiroid pasien penyakit ginjal kronik mengalami peningkatan dari nilai normal pada semua pasien yang diperiksa dengan rerata $208,97 \pm 119,83$


7.1.2 Pada penelitian ini ditemukan nilai *distal latency* paling panjang, dengan amplitudo paling kecil dan *velocity* paling lambat pada pasien penyakit ginjal kronik terdapat pada pasien dengan neuropati uremik apabila dibandingkan dengan pasien tanpa neuropati.

7.1.3 Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar hormon paratiroid pada pasien penyakit ginjal kronik yang mengalami neuropati uremik dan tanpa neuropati

7.2 Saran

7.2.1 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rancangan penelitian kohort dimana dilakukan pengukuran neuropati perifer serta kadar hormon paratiroid sebelum dan sesudah pasien menjalani hemodialisa.

7.2.2 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kadar hormon paratiroid seperti pola diet kalsium terhadap terjadinya neuropati perifer pasien



penyakit ginjal kronik

- 7.2.3 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran toksin uremik lain yang dapat mengakibatkan neuropati perifer.

