

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran kadar hemoglobin dan hematokrit pada pasien *Idiopathic Scoliosis* di RSUP Dr. M. Djamil Padang didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Distribusi usia pada pasien *Idiopathic Scoliosis* di Poliklinik Orthopedi RSUP Dr. M. Djamil Padang berada pada kelompok *Adolescent* dengan usia terbanyak pada rentang 14 -16 tahun.
2. Distribusi jenis kelamin pada pasien *Idiopathic Scoliosis* di RSUP Dr. M. Djamil Padang semuanya berjenis kelamin perempuan.
3. Kadar hemoglobin pada pasien *Idiopathic Scoliosis* di RSUP Dr. M. Djamil Padang tidak terdapat peningkatan.
4. Kadar hematokrit pada pasien *Idiopathic Scoliosis* di RSUP Dr. M. Djamil Padang tidak terdapat peningkatan.

6.2 Saran

1. Bagi klinisi dapat memperhatikan kadar hemoglobin dan hematokrit pada pasien sebagai indikasi terhadap kondisi keparahan yang diakibatkan *Idiopathic Scoliosis*. Selain itu klinisi juga dapat memperhatikan riwayat perjalanan penyakit *Idiopathic Scoliosis* pasien mulai dari keluhan utama dan gejala klinis pertama kali muncul sampai pengambilan keputusan tindakan operasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih banyak sampel kadar hemoglobin dan hematokrit dan meneliti pada pasien sebelum dan sesudah operasi pada pasien *Idiopathic Scoliosis*. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat meneliti kondisi lain yang mempengaruhi kadar hemoglobin dan hematokrit pada pasien *Idiopathic Scoliosis*.