

**GAMBARAN FAKTOR RESIKO PENYAKIT GASTRITIS  
PADA GERIATRI DI RSUP M. DJAMIL PADANG**



**Skripsi  
Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai  
Pemenuhan Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Kedokteran**

**Oleh:**

**Ulfa Inten Waluyani**

**No. BP : 1610312018**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**


**2019**

## ABSTRACT

*Gastritis is an inflammatory disease of the stomach lining tissue. This disease is ranked fourth in Indonesia with the most sufferers. Gastritis can be caused by various risk factors such as irregular eating patterns, smoking habits, NSAID use, and stress. Various ages can suffer from this disease. Starting from youth to geriatrics. Geriatrics have a great opportunity to easily suffer from gastritis. This relates to the condition of organs that have experienced a decline in form and function. One of them is the stomach which has decreased the number of protective factors of the stomach wall. So that the presence of trigger factors can easily damage the stomach wall leading to gastritis. This research was conducted to look for a description of the risk factors for gastritis in geriatrics.*

*This research is a descriptive study with cross sectional design. The data used are primary data using a questionnaire as a measurement tool. The sample consisted of 40 geriatric gastritis sufferers. Data analysis in this study used univariate analysis.*

*Based on the research conducted, it can be concluded that (1) Geriatric age characteristics of gastritis sufferers were mostly at the age of 60-69 years at 67.6% (2) Sex characteristics of geriatric gastritis sufferers were most common in women at 54.1% (3 ) Frequency distribution of dietary risk factors for geriatrics has regular eating habits of 64.9% (4) Frequency distribution of smoking risk factors for geriatrics has the most non-smoking habits of 70.3% (5) Frequency distribution of stress risk factors for geriatrics no stress at most 97.3% (6) Frequency distribution of risk factors for NSAID use in geriatrics has a habit of not consuming NSAIDs by 73%*



## ABSTRAK

Gastritis merupakan penyakit radang pada jaringan dinding lambung. Penyakit ini berada pada urutan ke empat di Indonesia dengan penderita terbanyak. Gastritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor resiko seperti pola makan yang tidak teratur, kebiasaan merokok, penggunaan OAINS, serta stres. Berbagai usia dapat menderita penyakit ini. Mulai dari masa muda hingga geriatri. Geriatri memiliki peluang besar untuk mudah menderita gastritis. Hal ini berkaitan dengan kondisi organ yang telah mengalami penurunan bentuk dan fungsi. Salah satunya lambung yang telah mengalami penurunan jumlah faktor pelindung dinding lambung. Sehingga keberadaan faktor pencetus dapat dengan mudah merusak dinding lambung yang berujung pada penyakit gastritis. Penelitian ini dilakukan untuk mencari gambaran faktor resiko penyakit gastritis pada geriatri.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Data yang digunakan merupakan data primer dengan menggunakan kuisioner sebagai alat ukurnya. Sampel terdiri dari 40 geriatri penderita gastritis. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Karakteristik usia geriatri penderita gastritis paling banyak pada usia 60-69 tahun sebesar 67,6% (2) Karakteristik jenis kelamin pada geriatri penderita gastritis paling banyak terjadi pada perempuan sebesar 54,1% (3) Distribusi frekuensi faktor resiko pola makan pada geriatri memiliki kebiasaan makan yang teratur sebesar 64,9% (4) Distribusi frekuensi faktor resiko merokok pada geriatri paling banyak memiliki kebiasaan tidak merokok sebesar 70,3% (5) Distribusi frekuensi faktor resiko stress pada geriatri paling banyak tidak stress sebesar 97,3% (6) Distribusi frekuensi faktor resiko penggunaan OAINS pada geriatri memiliki kebiasaan tidak mengkonsumsi OAINS sebesar 73%

