

BAB 7

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi frekuensi kejadian kolelitiasis terbanyak adalah pada jenis kelamin perempuan dan kelompok umur 40-59 tahun.
2. Tidak terdapat hubungan antara kadar kolesterol total dengan kejadian kolelitiasis di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2010-2014.
3. Tidak terdapat hubungan antara kadar LDL plasma dengan kejadian kolelitiasis di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2010-2014.
4. Terdapat hubungan antara kadar HDL rendah dengan kejadian kolelitiasis di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2010-2014.
5. Terdapat hubungan antara kadar trigliserida tinggi dengan kejadian kolelitiasis di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2010-2014.
6. Tidak terdapat hubungan antara dislipidemia dengan kejadian kolelitiasis di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode 2010-2014.

6.2. Saran

1. Setiap individu yang memiliki karakteristik jenis kelamin perempuan dan usia lanjut perlu melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya dislipidemia dan kolelitiasis, sehingga penyakit bisa dicegah dan ditangani secara dini.

2. Perlu dilakukan pemeriksaan profil lipid pada setiap pasien kolelitiasis untuk mengetahui adanya dislipidemia, sehingga pasien bisa ditangani secara komprehensif.
3. Perlu dilakukan penelitian mengenai faktor resiko atau variabel lain yang mempengaruhi kejadian kolelitiasis.

