

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap gambaran faktor risiko penderita stroke dengan covid-19 pada pasien yang dirawat inap di RSUP Dr. M. Djamil Padang didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Distribusi frekuensi pasien stroke dengan COVID-19 yang dirawat inap di RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah sebanyak 9,4%.
2. Stroke iskemik merupakan jenis stroke dengan COVID-19 terbanyak yang di rawat inap di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
3. Distribusi usia pasien stroke dengan COVID-19 yang menjalani rawat inap di RSUP Dr. M. Djamil Padang terbanyak berada pada kelompok usia ≥ 65 tahun dan lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Faktor risiko pasien stroke dengan COVID-19 yang terbanyak ditemukan berturut- turut adalah abnormalitas nilai D-dimer, hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, obesitas, dan riwayat penyakit jantung.
4. Terdapat hubungan antara faktor risiko hipertensi dengan kejadian stroke dengan pada pasien COVID-19. Faktor risiko lain pada penelitian ini tidak memiliki hubungan dengan kejadian stroke pada pasien COVID-19.

6.2 Saran

1. Perlunya dilakukan penatalaksanaan segera pada pada pasien COVID-19 yang terkena stroke.
2. Perlunya penatalaksanaan segera pada pasien COVID-19 dengan komorbid hipertensi dan perlunya pengendalian terhadap komorbid penyakit hipertensi pada pasien COVID-19.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar terkait hubungan faktor risiko dengan kejadian stroke pada pasien COVID-19.