

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Tidak terdapat perbedaan karakteristik dasar subjek penelitian antara kelompok HTB dan LTB dari segi usia, jenis kelamin, faktor risiko, onset IMA-EST, dan karakteristik angiografi. Sedangkan nilai leukosit, netrofil dan gula darah sewaktu lebih tinggi pada kelompok HTB
2. Rerata nilai SII pasien IMA-EST pada kelompok HTB lebih tinggi daripada kelompok LTB
3. Nilai *cut off* SII ≥ 952.41 memiliki sensitivitas dan spesifisitas cukup baik dalam memprediksi HTB

6.2 Saran

1. Nilai SII dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penanda adanya beban trombus tinggi pada pasien IMA-EST sehingga pasien IMA-EST yang mempunyai nilai SII tinggi dapat dilakukan persiapan pre dan intra tindakan seperti penggunaan terapi penghambat GPIIb/IIIa atau aspirasi trombus mekanikal untuk mencegah komplikasi HTB dan mendapatkan luaran yang lebih baik
2. Dapat dilakukan penelitian lanjutan pada subjek khusus dengan membedakan kelompok diabetes melitus dan non diabetes melitus.