

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

- 7.1.1. Sebagian besar siswa SDN 13 Kapalo Koto terpapar asap rokok selama 5-10 tahun.
- 7.1.2. Sebagian besar siswa SDN 13 Kapalo Koto terpapar sebanyak 1-10 batang rokok per hari.
- 7.1.3. Rerata tekanan darah siswa SDN 13 Kapalo Koto sistolik berada pada persentil 54,488 dan diastolik 54,224.
- 7.1.4. Tidak terdapat hubungan antara lama paparan asap rokok dari anggota keluarga dengan tekanan darah siswa SDN 13 Kapalo Koto
- 7.1.5. Tidak terdapat hubungan antara jumlah paparan rokok dari anggota keluarga dengan tekanan darah siswa SDN 13 Kapalo Koto

7.2. Saran

- 7.2.1. Bagi siswa, agar menghindari paparan asap rokok yang berasal dari orang lain
- 7.2.2. Bagi orang tua perokok, sebaiknya berhenti merokok. Apabila masih merokok sebaiknya merokok di ruang terbuka dan tidak merokok di dekat orang lain.
- 7.2.3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan dengan *design* berbeda seperti *cohort* atau *case control* sehingga dapat lebih menggambarkan hubungan paparan asap rokok dengan tekanan darah anak dan mempertimbangkan faktor resiko lain seperti, obesitas, tinggi badan, usia, dan kebiasaan.