

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyakit rinosinusitis kronis paling sering ditemukan pada perempuan dibandingkan dengan laki – laki dan insiden penyakit rinosinusitis paling sering terjadi pada rentang usia 25 – 44 tahun.
2. Distribusi frekuensi tomografi komputer terbanyak berdasarkan kriteria Lund – Mackay adalah pada skor 16.
3. Distribusi frekuensi jumlah sinus yang terlibat adalah multisinusitis dan lokasi kelainan sinus paranasal perselubungan parsial terbanyak ditemukan pada sinus maksila kanan dan sinus maksila kiri. Lokasi kelainan sinus paranasal perselubungan total terbanyak ditemukan pada sinus maksila kiri, sinus etmoid anterior kanan, sinus etmoid posterior kanan dan kiri, serta kelainan kompleks osteomeatal paling banyak di temukan pada kompleks osteomeatal kanan dan kiri.

#### **6.2 Saran**

1. Diperlukan data yang lengkap yang didapatkan dari rumah sakit untuk membuat hasil gambaran tomografi komputer berdasarkan kriteria Lund – Mackay.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih besar dan jumlah sampel yang banyak.