

**PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN
PEMINATAN KEPERAWATAN JIWA
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Tesis, Juni 2016

Nur Aulia

Analisis Hubungan Faktor Risiko Bunuh Diri dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja di Kota Rengat Tahun 2016

xv + 99 Hal+12 Tabel+ 6Lampiran+ 3 Skema

Abstrak

Terjadi peningkatan angka kejadian bunuh diri khususnya pada kelompok usia remaja. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia dari kasus bunuh diri yang diterjadi dengan usia termuda adalah 13 tahun. Kejadian bunuh diri juga terjadi di Kota Rengat, dimana dari tahun sepanjang tahun 2015 terdapat kasus bunuh diri pada remaja dengan gantung diri dan percobaan bunuh diri dengan melompat dari ketinggian. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan ide bunuh diri dengan faktor risiko bunuh diri pada remaja. Desain penelitian analitik korelasi, pendekatan *crosssection* di SMP dan SMA sederajat di Kota Rengat. Data dianalisis menggunakan *chi square* dan analisis regresi logistik untuk multivariat. Sampel 365 remaja dengan *propotional random sampling*. Hasil penelitian adalah sebagian besar remaja memiliki ide bunuh diri yang tinggi. Tidak ada hubungan karakteristik usia dengan ide bunuh diri, dan tidak ada hubungan karakteristik jenis kelamin dengan ide bunuh diri. Ada hubungan faktor psikologis dan faktor biologis dengan ide bunuh diri. Tidak ada hubungan antara faktor keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor riwayat bunuh diri dan faktor orientasi seksual dengan ide bunuh diri. Faktor psikologis merupakan faktor yang paling dominan terhadap ide bunuh diri. Saran bagi sekolah untuk mengaktifkan kegiatan UKSJ sehingga dapat lebih dini dalam mengidentifikasi adanya keinginan bunuh diri pada remaja.

Kata Kunci : Ide Bunuh Diri, Faktor Risiko Bunuh Diri, Remaja

Daftar Pustaka : 2001-2016

S2 NURSING PROGRAM STUDY
Nursing Psychiatric
FACULTY OF NURSING ANDALAS UNIVERSITY

Thesis, June 2016
Nur Aulia

Analysis of Risk Factors for Suicide relationship with the idea of Suicide in Adolescents in the City Rengat 2016

xv + 99 + 12 + 6 Appendix Table + 3 scheme

Abstract

There is an increased incidence of suicide in this age group. Data from the National Commission for Child Protection in Indonesia of suicides that occurred with the youngest is 13 years old. At Rengat in 2015 there were cases of teen suicide by hanging himself and attempted suicide by jumping from a height. This can occur due to various risk factors for teen suicide include psychological factors, family factors, social environmental factors, biological factors, factors history of suicide and sexual orientation factor. This study aims to determine the relationship of suicide ideation with risk factors for suicide in adolescents. Analytical correlation research design, crosssection approach. Data were analyzed using chi square and logistic regression for multivariate analysis. Sample 365 adolescents with proportional random sampling. The result showed that most teens have high of the idea of suicide. There is a relationship of psychological factors and biological factors with the idea of suicide. There is no relationship between family factors, social environmental factors, factors history of suicide and sexual orientation factors with the idea of suicide. The psychological factor is the most dominant factor on the idea of suicide. Suggestions for schools to improve the counseling so earlier in identifying the presence of the idea of suicide by adolescents.

Keywords: Idea Suicide, Suicide Risk Factors, Youth

Bibliography: 2001-2016