

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang perbandingan nilai apgar antara persalinan normal dengan seksio sesarea elektif di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Distribusi nilai Apgar menit pertama dan kelima pada persalinan normal di RSUP Dr. M. Djamil Padang berada pada kategori normal.
2. Distribusi nilai Apgar menit pertama dan kelima pada seksio sesarea di RSUP Dr. M. Djamil Padang berada pada kategori normal.

Berdasarkan analisis statistik ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai Apgar antara persalinan normal dengan seksio sesarea elektif di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

7.2. Saran

Dari seluruh proses penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti yaitu :

1. Bagi masyarakat, terutama ibu hamil tidak dianjurkan untuk melakukan persalinan dengan teknik seksio sesarea bila tidak ada indikasi medis terutama indikasi objektif (seperti: panggul sempit absolut, kelainan genital dan penyakit yang merupakan hambatan dalam proses persalinan, malposisi janin, plasenta

previa, riwayat ruptur uteri, preeklampsia-eklampsia berat, penyakit infeksi pada ibu).

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara metode persalinan dengan efek yang ditimbulkannya terhadap ibu dan bayi (seperti: mortalitas ibu dan bayi, perdarahan postpartum, cedera traktus genitalis, infeksi pada ibu, trauma lahir pada bayi, kebutuhan intubasi, dan lama rawat di NICU).