

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang perbedaan rerata rasio natrium dan kalium antara preeklamsi berat *early onset* dengan preeklamsi berat *late onset* di RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

7.1.1 Rerata rasio natrium dan kalium pada *early onset* dalam batas normal.

7.1.2 Rerata rasio natrium dan kalium pada *late onset* dalam batas normal.

7.1.3 Tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara rasio natrium dan kalium pada preeklamsia berat *early onset dan late onset*.

7.2 Saran

7.2.1 Perlu perhatian khusus kepada pasien dengan preeklamsia berat baik yang *early onset* maupun *late onset* karena bisa membahayakan siibu dan dijanin.

7.2.2 Perlu penelitian prospektif lebih lanjut untuk meneliti perbedaan rasio Natrium dan Kalium pada preeklamsia berat antara *early onset* dan *late onset* dan sampel yang lebih besar.

7.2.3 Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik menggunakan design penelitian lain seperti *case control study* yang menggunakan data primer atau pengukuran langsung menggunakan kuisisioner sehingga tidak didapatkan hasil yang bias.