

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan :

1. Terdapat perbedaan jumlah perdarahan pada pasien yang menggunakan misoprostol 400mcg dengan oksitosin 10 IU I.M pada manajemen aktif kala III, dimana jumlah perdarahan pada penggunaan misoprostol 400mcg lebih sedikit dibandingkan dengan oksitosin 10IU I.M.
2. Terdapat perbedaan waktu kala III pada pasien yang menggunakan misoprostol 400mcg dengan oksitosin 10 IU I.M pada manajemen aktif kala III, dimana waktu pelepasan pada penggunaan misopostol 400mcg lebih cepat dibandingkan oksitosin 10 IU I.M.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penatalaksanaan pencegahan perdarahan pasca persalinan dengan menggunakan misoprostol 400 µg per sublingual untuk dapat disosialisasikan.
2. Hasil penelitian ini dapat diusulkan untuk diterima sebagai prosedur pencegahan perdarahan pasca persalinan dan kemudian disosialisasikan bila telah mendapat persetujuan di unit pelayanan kesehatan primer (puskesmas, rumah bersalin dan lain-lain).
3. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan bagi bidan praktik mandiri dalam penanganan manajemen aktif kala III.