

BAB 7 PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang efek pemberian gambir terstandarisasi (*Uncaria gambir* Roxb.) terhadap ulkus gaster tikus wistar yang diinduksi etanol, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran histopatologi gaster tikus wistar yang diberi terapi gambir terstandarisasi setelah diinduksi etanol bervariasi, dimulai dari mukosa normal, deskuamasi epitel dan erosi epitel.
2. Terdapat efek pemberian gambir terstandarisasi (*Uncaria gambir* Roxb.) terhadap perbaikan kerusakan integritas mukosa gaster tikus yang diinduksi etanol. Efek perbaikan yang paling tinggi terdapat pada pemberian dosis 200 mg/kgBB.
3. Secara histopatologi terdapat perbedaan perbaikan kerusakan integritas mukosa gaster tikus wistar yang diinduksi etanol dengan pemberian gambir terstandarisasi dengan dosis yang berbeda. Namun, secara statistik perbedaan tersebut tidak bermakna.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas disarankan agar :

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efek pemberian gambir terstandarisasi terhadap ulkus gaster menggunakan metode induksi yang berbeda dan dilakukan secara pre dan post design.

2. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui mekanisme gambir dalam memperbaiki kerusakan mukosa gaster.
3. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan agar gambir dapat dikonsumsi secara aman pada manusia

