


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKAMBUHAN
KLIEN SKIZOFRENIA DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS KUMUN DEBAI
KOTA SUNGAI PENUH JAMBI**

TESIS



**PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN KEKHUSUSAN
KEPERAWATAN JIWA FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2016**

PROGRAM STUDI S2 KEPERAWATAN

**KEKHUSUSAN KEPERAWATAN JIWA
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**Tesis, Oktober 2016
Azma Ulia**

Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Klien Skizofrenia Di Wilayah Kerja Puskesmas Kumun Debai Kota Sungai Penuh Jambi Tahun 2016

x+ 118 Hal + 2 Skema + 15 Tabel + 15 Lampiran

Abstrak

Tingginya angka kekambuhan klien skizofrenia di Puskesmas Kumun Debai ditunjukkan 40 dari 90 klien skizofrenia dirawat di rumah sakit berulang kali. Faktor yang memicu kekambuhan klien skizofrenia antara lain ketidakpatuhan minum obat, kurang dukungan keluarga dan petugas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kekambuhan klien skizofrenia di wilayah kerja puskesmas Kumun Debai Kota Sungai Penuh Jambi tahun 2016. Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Pengambilansampel dalam penelitian ini adalah acak sistimatikdenganjumlah sampel sebanyak 73 responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terpimpin dari tanggal 11 April sampai dengan 07 Mei 2016. Analisis data menggunakan *uji chi-square* dan *Regresi logistik ganda*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum obat, dukungan keluarga (dukungan emosi, dukungan informasi, dukungan intrumental, dukungan penilaian) dan dukungan petugas kesehatan dengan kekambuhan klien skizofrenia ($p\text{-value} < 0.05$). Faktor yang paling berhubungan dengan kekambuhan adalah dukungan emosi keluarga ($p\text{-value} = 0,008$, $OR = 4,286$). Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan keperawatan jiwa, untuk mengurangi frekuensi kekambuhan klien skizofrenia dengan menerapkan terapi keperawatan generalis dan spesialis dalam pelayanan berbasis komunitas.

Kata kunci: Kekambuhan, skizofrenia
Daftar pustaka : 99 (1998- 2015)

S2 NURSING STUDY PROGRAM
SPECIFICITY NURSING SOUL
UNIVERSITY FACULTY OF NURSING ANDALAS

Thesis, October 2016

Azma Ulia

Analysis of Factors Associated With Schizophrenia Relapse Clients In PHC Kumun Debai Sungai Penuh CityJambi Year 2016

x + 118 + 2 scheme Things + 15 + 15 Appendix Table

Abstract

The high rate of relapse of schizophrenia in PHC clients Kumun Debai indicated 40 out of 90 clients schizophrenia hospitalized repeatedly. The factors that trigger a relapse of schizophrenia other clients take medication noncompliance, lack of family support and health care workers. The purpose of this study was to determine the factors associated with relapse in schizophrenia clients working area health centers Kumun Debai Sungai Penuh City Jambi in 2016. This type of research is descriptive analytic with cross sectional approach. The samples in this study was a systematic random with a total sample of 73 respondents. Data were collected using questionnaires and interviews guided from April 11 until May 7, 2016. Data were analyzed using chi-square test and multiple logistic regression. The results showed that there is a significant relationship between medication adherence, family support (emotional support, information support, instrumental support, appraisal support) and support health workers with clients relapse of schizophrenia (p-value <0.05). Factors most associated with relapse is the emotional support of family (p-value = 0.008, OR = 4.286). This research is expected to be used as input for health centers to improve nursing service life, to reduce the frequency of relapse of schizophrenia clients by applying generalist and specialist nursing treatment in community-based services.

Keywords: Relapse, schizophrenia

Bibliography: 99 (1998- 2015)

