

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Fukuda *Stepping Test* memiliki sensitivitas yang baik dalam menentukan sisi lesi pada hipofungsi vestibuler perifer
2. Fukuda *Stepping Test* memiliki spesifisitas yang sangat baik dalam menentukan sisi lesi pada hipofungsi vestibuler perifer
3. Fukuda *Stepping Test* memiliki nilai prediksi positif yang sangat baik dalam menentukan sisi lesi pada hipofungsi vestibuler perifer
4. Fukuda *Stepping Test* memiliki nilai prediksi negatif yang cukup baik dalam menentukan sisi lesi pada hipofungsi vestibuler perifer

6.2 Saran

1. Fukuda *Stepping Test* dapat digunakan untuk mendeteksi adanya hipofungsi vestibular perifer unilateral pada layanan yang tidak memiliki sarana ENG
2. Dapat dilakukan pengembangan penelitian hipofungsi vestibular pada geriatri, HVP akut, diabetes melitus dan hipertensi
3. Diperlukan modalitas pemeriksaan lanjut seperti *rotatory chair* dan VEMP untuk mendeteksi lokasi HVP pada kasus negatif palsu pemeriksaan ENG