

BAB 7 PENUTUP


7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini disimpulkan:

1. Meningioma paling banyak ditemukan pada kelompok usia 41-50 tahun, jenis kelamin perempuan dan derajat histopatologik WHO derajat I.
2. Ekspresi reseptor progesteron lebih banyak pada meningioma WHO derajat II dibandingkan meningioma derajat I dan III
3. Tidak terdapat perbedaan ekspresi Reseptor Progesteron pada derajat histopatologik meningioma.
4. Tidak terdapat perbedaan ekspresi Ki-67 LI pada derajat histopatologik meningioma.
5. Terdapat hubungan terbalik antara ekspresi Reseptor Progesteron dan Ki-67 LI pada derajat histopatologik meningioma.

7.2 Saran

1. Perlunya keseragaman dalam fiksasi jaringan setelah operasi dengan menggunakan Normal *Baffer* Formalin (NBF) 10 % dan penggunaan parafin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai ekspresi reseptor progesteron dan Ki-67 LI pada meningioma dengan disain penelitian yang bersifat komparatif.



3. Perlunya kelengkapan data klinis yang lengkap pada lembaran status pengiriman pasien.

