

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RSUP
DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2022**



Skripsi
Diajukan ke Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas
Andalas untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Kebidanan

Oleh

NUR CINTIA DEWI
No. BP. 1910331003

Pembimbing :
Abdiana, SKM, M.Epid
Fitrayeni, SKM, M.Biomed

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
DEPARTEMEN KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2023**

ABSTRACT

FAKTORS ASSOCIATED WITH THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT WOMEN AT RSUP. DR. M. DJAMIL PADANG IN 2022

By

Nur Cintia Dewi, Abdiana, Fitrayeni, Defrin, Uliy Iffah, Hindun Mila Hudzaifah

Preeklampsia still a complication of pregnancy are in need of special attention if not to be overcome by directly resulted in an increase in the number of deaths of pregnant women. The factors that can cause preeklampsia for pregnant women among them are age, parity and the nutritional status of mothers. This research seeks to capture that deals with kejadian preeklampsia for pregnant women in RSUP Dr. M. Djamil Padang of 2022.

This research is a quarantinative study using analytic approach to cross sectional design. This research was carried out in sub-recorded medical section RSUP Dr.M.Djamil Padang. Data collection took place in May 2023. The sample in this study is a preeclampsia diagnosed pregnant mother of 129 people obtained with total sampling techniques. Data collection taken from patient medical records and analyzed univariat and bivariat (chi-square) with CI 95 %.

The result showed 64,3 % preeklampsia pregnant women with heavy. This research result indicates the majority of pregnant women with a heavy risk preeklampsia 60,5 % ($p = 0,046$; $OR = 2,263$; $CI\ 95\% = 1,081-4,736$), the parity of risky 56,6 % ($p = 0,040$; $OR = 2,297$; $CI\ 95\% = 1,101-1,790$) and nutritional status of risky 67,4 % ($p = 0,011$; $OR = 2,888$; $CI\ 95\% = 1,341-6,215$) 95.

It's concluded that there's an age relationship, Extremities and nutrition status of pregnant mothers against preeclampsia. Advice for health officials is particularly midwifes to increase counseling and socialization regarding pregnancy complications and raise caution to patients who are at risk of preeclampsia.

Keywords : *Preeclampsia, pregnant women, age, parity, nutritional status*

ABSTRAK

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2022

Oleh

Nur Cintia Dewi, Abdiana, Fitrayeni, Defrin, Uliy Iffah, Hindun Mila Hudzaifah

Preeklampsia masih merupakan komplikasi kehamilan yang masih memerlukan perhatian khusus jika tidak diatasi dengan tepat mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kematian ibu hamil. Adapun faktor yang dapat menyebabkan preeklampsia pada ibu hamil diantaranya adalah umur, paritas dan status gizi ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil di RSUP. Dr. M. Djamil Padang tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan analitik dengan desain *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan di Sub Bagian Rekam Medis RSUP Dr. M. Djamil Padang. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2023. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang didiagnosa preeklampsia berjumlah 129 orang yang diperoleh dengan teknik *total sampling*. Pengumpulan data diambil dari rekam medis pasien dan dianalisis secara univariat dan bivariat (*chi-square*) dengan CI 95%.

Hasil penelitian menunjukkan 64,3% ibu hamil dengan preeklampsia berat. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas ibu hamil preeklampsia berat dengan umur berisiko 60,5% ($p=0,046$; OR=2,263; CI 95%=1,081-4,736), paritas berisiko 56,6% ($p=0,040$; OR=2,297; CI 95%=1,101-1,790) dan status gizi berisiko 67,4% ($p=0,011$; OR=2,888; CI 95%=1,341-6,215).

Disimpulkan bahwa terdapat hubungan umur, paritas dan status gizi ibu hamil terhadap kejadian preeklampsia. Saran untuk petugas kesehatan khususnya bidan untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai komplikasi kehamilan dan meningkatkan kewaspadaan kepada pasien trutama yang berisiko mengalami preeklampsia.

Kata Kunci : Preeklampsia, ibu hamil, umur, paritas, status gizi