

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Karakteristik dasar pasien kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil yang mendapat kemoterapi berbasis platinum pada penelitian ini adalah terbanyak laki-laki, berusia <65 tahun, dan merupakan bekas perokok. Karsinoma sel skuamosa merupakan jenis sel terbanyak, dan ditemukan pada *stage* IVa.
2. Karakteristik yang tidak homogen pada penelitian ini adalah albumin dan regimen kemoterapi
3. Kelompok pasien KPKBSK yang tidak respon dengan kemoterapi berbasis platinum memiliki nilai rata-rata SII lebih tinggi dibandingkan dengankelompok respon.
4. Nilai *cut off* SII terhadap respon kemoterapi berbasis platinum pasien

7.2 Saran

1. Nilai SII prekemoterapi diharapkan dapat dijadikan salah satu penilaian untuk memprediksi respon kemoterapi, agar dapat membantu untuk mempersiapkan tatalaksana lebih lanjut pasien KPKBSK *stage* lanjut yang mendapat kemoterapi berbasis platinum.
2. Dilakukan penelitian selanjutnya yang bersifat *multicenter* untuk menilai sensitifitas dan spesifisitas nilai *cutoff* baru SII untuk pedoman dalam

