

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang interaksi obat antipsikotik pada pasien skizofrenia paranoid yang telah dilakukan dapat disimpulkan antara lain :

1. Potensi interaksi obat antipsikotik pada pasien skizofrenia paranoid terjadi pada 287 pasien (75%).
2. Kombinasi antipsikotik yang menyebabkan terjadinya interaksi obat adalah chlorpromazin-trihexyphenidyl 19%, haloperidol-trihexyphenidyl 16% serta 9% risperidon-fluoxetin dan trifluoperazin-trihexyphenidyl.
3. Tingkat keparahan interaksi obat antipsikotik terdiri dari 16% keparahan minor, 62 % keparahan moderat dan 22 % keparahan mayor.
4. Interaksi obat berdasarkan mekanisme terbagi atas 3 yang terdiri dari interaksi farmakodinamik (55%), interaksi farmakokinetik (38%) dan interaksi unknown (7%)

#### 5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian dengan metode prospektif untuk mengevaluasi obat yang diberikan dan mencegah kemungkinan terjadinya interaksi obat yang bermakna secara klinis.