



UNIVERSITAS ANDALAS
FAKTOR RISIKO POLA PENGASUHAN KEJADIAN *STUNTING*
PADA ANAK USIA BALITA (2-5 TAHUN) DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG TAHUN 2023

Oleh:

Nola Vita Sari

No.BP. 1911221003

Pembimbing 1 : Dr. Denas Symond, MCN

Pembimbing 2 : Resmiati, SKM, MKM

Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Gizi

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2023



UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKTOR RISIKO POLA PENGASUHAN KEJADIAN *STUNTING*
PADA ANAK USIA BALITA (2-5 TAHUN) DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG TAHUN 2023**

Oleh:

Nola Vita Sari

No.BP. 1911221003

**Diajukan Sebagai Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Gizi**

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2023

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ANDALAS

Skripsi, Juli 2023

NOLA VITA SARI, No. BP. 1911221003

“FAKTOR RISIKO POLA PENGASUHAN KEJADIAN *STUNTING* PADA ANAK USIA BALITA (2-5 TAHUN) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANDALAS KOTA PADANG TAHUN 2023”

xi + 88 halaman, 20 tabel, 2 gambar, 9 lampiran

ABSTRAK

Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi atau asupan zat gizi dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga anak terlalu pendek dibanding anak seusianya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko pola pengasuhan kejadian *stunting* pada anak usia balita (2-5 tahun) di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kota Padang tahun 2023.

Metode Penelitian

Desain studi yang digunakan adalah *case control*. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kota Padang. Total sampel adalah 60 balita yang berusia 2-5 tahun, terbagi menjadi 30 balita *stunting* dan 30 balita tidak *stunting*. Pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kuesioner pola asuh makan, pola asuh kesehatan, pola kebersihan, dan pola asuh stimulasi. Data dianalisis menggunakan *chi square* dengan melihat Odds Ratio (OR).

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan pola asuh makan ($p= 0,007$, OR= 6), pola asuh kesehatan ($p= 0,0001$, OR= 12,25), dan pola asuh stimulasi ($p= 0,0001$, OR= 58,5) dengan kejadian *stunting*. Untuk pola asuh kebersihan ($p= 0,7666$, OR= 1,195) tidak memiliki hubungan dengan kejadian *stunting*.

Kesimpulan

Adanya hubungan pola asuh makan, pola asuh kesehatan, dan pola asuh stimulasi dengan kejadian *stunting* dan tidak adanya hubungan pola asuh kebersihan dengan kejadian *stunting*.

Daftar Pustaka : 64 (2005-2022)

Kata Kunci : Pola asuh, *Stunting*, Tidak *Stunting*

FACULTY OF PUBLIC HEALTH

ANDALAS UNIVERSITY

Undergraduate Thesis, July 2023

NOLA VITA SARI, No. BP. 1911221003

"RISK FACTORS OF CARE PATTERNS OF STUNTING IN CHILDREN AGED 2-5 YEARS IN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS ANDALAS, PADANG CITY IN 2023"

xi + 88 pages, 20 tables, 2 pictures, 9 appendices

ABSTRACT

Background

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to malnutrition or intake of nutrients over a long period of time, so that children are too short compared to children of their age. The purpose of this research is to find out the risk factors for stunting care patterns in children aged under five (2-5 years) in the Working Area of the Andalas Health Center, Padang City in 2023.

Methods

The study design used was a case control. This research was conducted in the Working Area of the Andalas Health Center, Padang City. The total sample is 60 toddlers aged 2-5 years, divided into 30 stunted toddlers and 30 toddlers who are not stunted. The sample was taken using accidental sampling. Data collection was carried out by interviewing questionnaires on eating parenting patterns, health parenting patterns, hygiene patterns, and stimulation parenting patterns. Data were analyzed using chi square by looking at the Odds Ratio (OR).

Results

The results showed that there was a relationship between parenting to eat ($p= 0.007$, $OR= 6$), parenting to health ($p= 0.0001$, $OR= 12.25$), and parenting to stimulation ($p= 0.0001$, $OR= 58$), 5) with stunting events. Cleanliness parenting style ($p=0.7666$, $OR=1.195$) had no relationship with stunting.

Conclusions

There is a relationship between eating parenting, health parenting, and stimulation parenting with stunting and there is no relationship between hygiene parenting and stunting.

References : 64 (2005-2022)

Keywords : *Parenting, Stunting, Non-Stunting*