

BAB 6

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Gambaran Faktor Risiko Hiperbilirubinemia Pada Neonatus yang Dirawat di Neonatologi RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah:

1. Hiperbilirubinemia pada neonatus sebagian besar ditemukan pada pasien kategori *high risk*.
2. Lebih dari separuh neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia memiliki jenis kelamin laki-laki.
3. Neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia hanya sepertiga yang uisa gestasinya *preterm*.
4. Neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia hanya sepertiga yang memiliki berat badan lahir rendah.
5. Neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia hanya sedikit sekali yang disebabkan oleh *breastfeeding jaundice*.
6. Neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia hanya sepertiga yang disebabkan oleh inkompatibilitas darah.
7. Tidak ditemukan neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia mempunyai faktor risiko polisitemia.
8. Neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia hanya satu orang yang lahir dari ibu diabetes Melitus.
9. Neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia hanya sedikit yang disebabkan oleh kolestasis.
10. Neonatus yang didiagnosis hiperbilirubinemia hanya seperempat yang disebabkan infeksi

6.2. Saran

Dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode analitik untuk mengetahui hubungan dari berbagai faktor risiko hiperbilirubinemia pada neonatus.

