

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan.

1. Pasien karsinoma tiroid lebih banyak di usia 45 – 64 tahun.
2. Perempuan lebih sering terkena karsinoma tiroid dengan perbandingan 4,5 : 1 terhadap laki – laki.
3. Keluhan utama yang paling banyak dikeluhkan adalah benjolan di leher.
4. Ukuran nodul karsinoma tiroid terbanyak ditemukan dengan ukuran > 4 cm.
5. Berdasarkan jenis histopatologi, pasien dengan diagnosis karsinoma tiroid papiler ditemukan sebanyak 83% dari total pasien.
6. Jenis tindakan *total thyroidectomy* merupakan tindakan terbanyak yang dilakukan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi rutin kepada dokter di RSUP Dr. M. Djamil untuk mengingatkan pentingnya kelengkapan pengisian rekam medis agar dapat menyempurnakan penelitian ini di masa depan.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai karsinoma tiroid dengan menambahkan variabel seperti stadium dan jenis nodul.

