

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Menurut penelitian tentang evaluasi skala nyeri pasien sirkumsisi dengan anestesia lidokain hidroklorida pada anak laki-laki dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Distribusi pasien sirkumsisi menurut umur pada penelitian ini adalah kelompok anak usia sekolah dengan rentang 7-13 tahun.
2. Distribusi pasien sirkumsisi menurut indeks massa tubuh pada penelitian ini adalah anak dengan indeks massa tubuh normal dan overweight.
3. Rata-rata waktu timbulnya nyeri adalah 47,73 menit.
4. Rata-rata skala nyeri yang dinilai dengan Face Scale adalah 2,33. Rata-rata skala nyeri yang dinilai dengan Face Scale kurang dari 3 itu menunjukkan nyeri yang tidak mengganggu aktivitas.

6.2 Saran

1. Penelitian dapat dilakukan lebih lanjut tentang evaluasi skala nyeri pasien sirkumsisi dengan menggunakan obat anestesia lidokain 2% sebanyak 3 ampul karena 3 ampul adalah dosis maksimum pada anak dengan berat badan 20-29 kg.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan evaluasi skala nyeri pasien sirkumsisi yang diberikan obat anestesia lidokain dengan menggunakan metode pengukuran skala nyeri Face Scale yang diukur dalam waktu yang teratur yaitu setiap 30 menit atau dapat menggunakan metode pengukuran skala nyeri selain Face Scale seperti Numerical Analogue dan Visual Analogue.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan evaluasi skala nyeri pasien sirkumsisi yang diberikan obat deksametason atau obat adjuvan lainnya sebelum sirkumsisi dilakukan.