

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Rerata kadar hormon kortisol pada awal pasien didiagnosis sepsis adalah 34,48 (17,78), rerata kortisol hari rawatan kedua adalah 24,68 (12,12) dan rerata kortisol pada hari rawatan keempat adalah 17,98 (11,95).
2. Angka kejadian CIRCI pada pasien sepsis hingga hari rawatan 2 adalah 4 orang (10,81%).
3. Angka kejadian CIRCI pada pasien sepsis hingga hari rawatan 4 adalah 13 orang (35,13%).
4. Terdapat peningkatan proporsi CIRCI pada pasien sepsis di hari rawatan empat.

7.2 Saran

1. Klinisi perlu memikirkan kemungkinan terjadinya CIRCI pada pasien sepsis dalam rawatan, sehingga penanganan pasien menjadi lebih komprehensif.
2. Pemeriksaan kadar kortisol pada pasien sepsis yang dicurigai CIRCI dapat mulai dipikirkan pada hari rawatan 2, sehingga kebutuhan pasien akan terapi kortikosteroid dapat ditentukan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat faktor yang memengaruhi terjadinya serta gejala dan tanda CIRCI pada pasien sepsis, sehingga dapat membantu memprediksi kejadian CIRCI pada pasien sepsis.

