

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pasien DM Tipe 2 dengan PJK di RSUP Dr. M. Djamil Januari 2012-Desember 2015 lebih banyak memiliki kadar HDL kolesterol rendah.
2. Pasien DM Tipe 2 dengan PJK di RSUP Dr. M. Djamil Januari 2012-Desember 2015 lebih dari setengah memiliki rasio total kolesterol/HDL kolesterol tinggi.
3. Pasien DM Tipe 2 dengan PJK di RSUP Dr. M. Djamil Januari 2012-Desember 2015 lebih dari setengah memiliki kadar kolesterol total normal.

6.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut pada pasien DM tipe 2 dengan PJK yang memiliki kadar HDL kolesterol normal – tinggi sehingga dapat diketahui faktor yang berperan dalam meningkatkan kadar HDL kolesterol pasien DM tipe 2 dengan PJK di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
2. Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara kadar HDL kolesterol pada pasien DM tipe 2 dengan PJK.
3. Hal yang dapat diaplikasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah diharapkan dilakukan edukasi pada pasien DM Tipe 2 dengan PJK mengenai pentingnya menjaga profil lipid dalam batas normal sehingga pasien dapat terhindar dari komplikasi DM tipe 2 dan terhindar dari re – infark.