

## BAB 7 PENUTUP

### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan sepsis neonatorum dengan berat badan lahir pada bayi di RSUP Dr. M. Djamil Padang, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah pasien yang mengalami sepsis lebih banyak dengan *late onset sepsis* dibandingkan *early onset sepsis*.
2. BBLR lebih banyak ditemukan pada kelompok sepsis daripada yang tidak sepsis, walaupun secara statistik tidak bermakna.
3. BBLR lebih berisiko untuk mengalami sepsis dibandingkan yang tidak BBLR, walaupun tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik.

### 7.2 Saran

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya sepsis neonatorum.
2. Petugas pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan promosi kesehatan terutama kepada ibu hamil, karena perawatan bayi baru lahir yang sempurna tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak disertai perawatan antenatal yang baik, apabila hal ini sudah dilaksanakan dengan baik maka diharapkan tidak terjadi persalinan dengan BBLR.

3. Kebersihan dan kesterilan tempat dan alat-alat kedokteran di lingkungan perawatan pasien hendaknya terus dijaga, karena infeksi terutama pada bayi baru lahir banyak bersumber dari infeksi nosokomial.

