


**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI KELURAHAN  
LUBUK BUAYA WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
LUBUK BUAYA PADANG TAHUN 2017**



**Penelitian Keperawatan Anak**

**YESA RAHMADANI  
1511316046**

**Dosen Pembimbing:  
Ns. Deswita, M. Kep, Sp. Kep. An  
Ns. Trivini Valencia, S. Kep, M. Kep**

**FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

**FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
APRIL 2017**

**Nama : Yesa Rahmadani  
No. Bp : 1511316046**

**Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di  
Kelurahan Lubuk Buaya Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya  
Padang Tahun 2017**

**ABSTRAK**

Penyakit diare masih menjadi masalah global dengan derajat kesakitan dan kematian yang tinggi di berbagai negara terutama di negara berkembang. Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2010, Diare merupakan penyebab kematian pertama pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%). Berdasarkan karakteristik penduduk, kelompok umur balita adalah kelompok umur yang paling tinggi menderita diare di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Lubuk Buaya Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah ibu balita yang mempunyai balita umur 12-59 bulan dengan jumlah sampel 166 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah menggunakan *chi-square*. Hasil penelitian diperoleh bahwa balita yang mengalami diare adalah sebesar 52,4%. Hasil analisis data diperoleh faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita adalah pengetahuan ( $p=0,000$ ), Riwayat ASI eksklusif ( $p=0,000$ ), perilaku cuci tangan ( $p=0,000$ ), sarana air bersih ( $p=0,000$ ), dan jamban ( $p=0,000$ ). Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada puskesmas untuk dapat menyusun program promosi kesehatan khususnya tentang ASI Eksklusif dan Perilaku Cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar untuk memutus rantai penyebaran kuman diare.

**Kata Kunci : Faktor-faktor, kejadian diare  
Daftar Pustaka : 43 (2007-2016)**

**NURSING FACULTY  
ANDALAS UNIVERSITY  
APRIL 2017**

**Name : Yesa Rahmadani  
No. Bp : 1511316046**



**Factors Associated With Genesis Diarrhea In Toddler In  
Lubuk Buaya Urban Village Puskesmas  
Lubuk Buaya Padang Year 2017**

**ABSTRACT**

Diarrheal disease is still a global problem with the degree of the high morbidity and mortality in many countries, especially in developing countries. Based on the characteristics of the population, the toddler age group is the highest age group suffering from diarrhea in Indonesia. The purpose of this study was to determine the factors associated with the incidence of diarrhea in children under five in the village of Lubuk Buaya Work Area Health Center, Lubuk Buaya equivalents in 2017. This study is a descriptive cross-sectional design. The population in this study were mothers who had children aged 12-59 months with a sample of 166 people. Data was collected by using a questionnaire. The data obtained this study dioleh a chi performance-square. Results showed that children who had diarrhea was 52.4%. The results of data analysis of factors related to the occurrence of diarrhea in infants is knowledge ( $p = 0.000$ ), history of exclusive breastfeeding ( $p = 0.000$ ), handwashing ( $p = 0.000$ ) and clean water facilities ( $p = 0.000$ ), and the latrines ( $p = 0.000$ ). Based on the research results suggested to health centers to devise a health promotion program in particular about exclusive breastfeeding and Behavior Handwashing with soap is good and right to break the chain of spread of germs diarrhea.

**Keywords : Factro-factor, the incidence of diarrhea  
Bibliography : 43 (2007-2016)**