

## **BAB 7** **PENUTUP**

### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Hubungan *Personal Hygiene* dengan Kejadian Enterobiasis pada anak Panti Asuhan di Wilayah Kerja Puskesmas Rawang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Personal hygiene* anak pada umumnya sudah baik, dimana Panti Asuhan Ridho Rahmat memiliki 73,5% anak dengan *personal hygiene* baik dan di Panti Asuhan Wira Lisna ada 66,7% yang memiliki *personal hygiene* baik.
2. Kejadian enterobiasis di Panti Asuhan Ridho Rahmat yaitu 11,8% dan di Panti Asuhan Wira Lisna tidak ada satupun yang mengalami enterobiasis.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara *personal hygiene* dengan kejadian enterobiasis.

### **7.2 Saran**

1. Perlu dilaksanakan pemberian obat cacing secara berkala
2. Bagi penelitian selanjutnya, dalam pengambilan sampel untuk pemeriksaan enterobiasis diharapkan ditambah dengan sampel kuku tangan.
3. Bagi penelitian berikutnya, sebaiknya pengambilan sampel anal swab dilakukan 2-3 kali dalam hari yang berbeda karena siklus bertelur dari cacing betina *Enterobius vermicularis* yang tidak teratur.