

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasien TB anak yang tercatat di poli anak RSUP Dr M Djamil Padang pada tahun 2016, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Riwayat kontak TB BTA+ paling banyak ditemukan pada kelompok umur 5-<10 tahun. Riwayat kontak atas dasar laporan keluarga paling banyak ditemukan pada kelompok umur 10-14 tahun.
2. Riwayat demam ≥ 2 minggu paling banyak ditemukan pada kelompok umur 0-<5 tahun.
3. Riwayat batuk kronik ≥ 3 minggu paling banyak ditemukan pada kelompok umur 5-<10 tahun.
4. Status gizi malnutrisi ringan-sedang paling banyak ditemukan pada kelompok umur 0-<5 tahun. Status gizi malnutrisi berat paling banyak ditemukan pada kelompok umur 10-14 tahun.
5. Pembesaran kelenjar getah bening paling banyak ditemukan pada kelompok umur 0-<5 tahun.
6. Hasil uji tuberkulin positif paling banyak ditemukan pada kelompok umur 0-<5 tahun.
7. Pembengkakan tulang/sendi panggul, lutut, falang menunjukkan frekuensi yang sama pada setiap kelompok umur
8. *Rontgen* toraks sugestif TB paling banyak ditemukan pada kelompok umur 0-<5 tahun.

6.2 Saran

1. Akademisi dan peneliti lain

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai hubungan tiap-tiap variabel yang menunjukkan hubungan setiap indikator skoring TB dengan umur penderita.

2. Pelayanan kesehatan dan masyarakat

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam menegakkan diagnosis TB anak dan meningkatkan pengetahuan mengenai gejala yang paling sering timbul pada TB anak berdasarkan umur penderita.

