

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Alai Kota Padang sebagai berikut:

1. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif lebih banyak dibandingkan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif.
2. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif jumlahnya lebih sedikit menderita diare dibandingkan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif.
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Alai Kota Padang.

7.2 Saran

Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan saran terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi ibu-ibu bayi di wilayah kerja Puskesmas Alai Kota Padang harus berusaha untuk meningkatkan lagi pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya diare pada bayi.
2. Mengupayakan dukungan dari pihak-pihak terkait yang dapat mendukung gerakan pemberian ASI eksklusif agar dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi seperti diare pada bayi.