


BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang hubungan faktor risiko dengan kejadian asma bronkial pada siswa usia 13-14 tahun di Kota Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prevalensi asma pada siswa –usia 13-14 tahun di Kota Padang adalah 5,6%
2. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian asma bronkial.
3. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian asma bronkial.
4. Terdapat hubungan antara pola diet dengan kejadian asma bronkial.
5. Tidak terdapat hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian asma bronkial.
6. Tidak terdapat hubungan antara penggunaan parasetamol dengan kejadian asma bronkial.
7. Tidak terdapat hubungan antara bahan bakar memasak dengan kejadian asma bronkial.
8. Tidak terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian asma bronkial.
9. Tidak terdapat hubungan antara paparan asap rokok dengan kejadian asma bronkial.
10. Tidak terdapat hubungan antara kepemilikan hewan peliharaan dengan kejadian asma bronkial.



7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan faktor risiko dengan kejadian asma bronkial pada siswa usia 13-14 tahun di Kota Padang, peneliti menyarankan beberapa hal berikut:

1. Diharapkan masyarakat agar lebih memperhatikan pola diet, terutama dengan memperbanyak konsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan, karena berhubungan dengan risiko kejadian asma bronkial
2. Diharapkan peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian ini untuk dapat mengembangkan penelitian dengan sampel yang lebih luas atau terkontrol agar dapat hasil yang lebih akurat.

