

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi di rumah sakit Kota Padang tahun 2017, maka dapat diambil kesimpulan :

- 1 Lebih dari separuh penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi dalam keadaan cemas sedang.
- 2 Lebih dari separuh penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi memiliki maturitas rendah.
- 3 Lebih dari separuh penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi memiliki dukungan keluarga negatif.
- 4 Lebih dari separuh penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi memiliki dukungan sosial kurang.
- 5 Terdapat hubungan signifikan antara maturitas dengan kecemasan penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi.
- 6 Terdapat hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan kecemasan penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi.
- 7 Terdapat hubungan signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi.
- 8 Maturitas adalah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kecemasan penderita kanker serviks yang melakukan kemoterapi.

B Saran

- 1 Bagi rumah sakit.
Diharapkan melatih perawat dalam meningkatkan sensitifitas terhadap deteksi dini kecemasan yang dialami klien.
- 2 Bagi profesi keperawatan.

Diharapkan kepada perawat untuk memberikan asuhan keperawatan untuk mengatasi dan menurunkan kecemasan klien yang melakukan kemoterapi khususnya klien kanker serviks dengan cara memberikan pengetahuan tentang kemoterapi dan efeknya serta memberikan dukungan

informatif dan dukungan emosional.

3. Bagi institusi pendidikan keperawatan.

Diharapkan mampu memberikan intervensi dalam menangani kecemasan klien dan mampu mengidentifikasi kondisi klien fisik maupun psikologis.

4. Bagi peneliti lain.

Bagi peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada kanker jenis lainnya.

