

SKRIPSI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
KEJADIAN SEPSIS NEONATORUM AWITAN DINI PADA BAYI  
BARU LAHIR DI RUANGAN PERINATOLOGI**

**RSUP DR.M. DJAMIL  
PADANG**

**Penelitian Keperawatan Anak**



**RICCA TAMI FEBRIYANTI**

**1311311073**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Ns. DESWITA, M.Kep, Sp.Kep.An**

**Ns. NENI AMPI JUWITA, M.Kep, Sp. Kep.An**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

JULI, 2017

Nama : Ricca Tami Febriyanti  
BP : 1311311073

**GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR KEJADIAN SEPSIS NEONATORUM  
AWITAN DINI PADA BAYI BARU LAHIR DIRUANGAN  
PERINATALOGI RSUP DR. M DJAMIL  
PADANG**

**ABSTRAK**

Infeksi yang terjadi pada bayi baru lahir jika tidak dapat diatasi akan menyebabkan kematian pada bayi. Sepsis neonatorum sebagai salah satu bentuk penyakit infeksi pada bayi baru lahir masih merupakan masalah utama yang belum terpecahkan sampai saat ini, WHO juga melaporkan *casefatality rate* pada kasus sepsis neonatorum masih tinggi, yaitu sebesar 40%. Sepsis neonatorum sering kali tidak terdeteksi sehingga berakibatkan kematian. Berdasarkan data SDKI tahun 2013, angka kematian bayi dan balita baru mencapai 32 dan 40 per 1000 kelahiran hidup. Tujuan penelitian adalah menggambarkan faktor-faktor kejadian sepsis neonatorum awitan dini yaitu usia ibu, jenis persalinan, penyakit ibu, riwayat pemeriksaan antenatal, berat badan lahir dan usia kehamilan. Desain penelitian yang digunakan adalah *studi dokumentasi* dengan teknik pengambilan sampel yaitu *total sampling*. Sampel penelitian ini adalah 80 bayi yang terdiagnosa sepsis neonatorum awitan dini di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Penelitian dilakukan dari bulan Februari-Juli 2017. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi/lembar checklist, uji statistik menggunakan uji chi-square. Berdasarkan hasil yang didapatkan, usia ibu beresiko <20 dan >35 tahun (58,8%), jenis persalinan dengan tindakan (45%), riwayat penyakit ibu (63,8%), riwayat pemeriksaan antenatal tidak teratur (53,8%), BBLR (47,5%) dan usia kehamilan kurang bulan (53,8%). Disarankan bagi tenaga kesehatan agar meningkatkan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan terkait faktor ibu yang berhubungan dengan kejadian sepsis neonatorum.

**Kata Kunci : Faktor yang mempengaruhi, Kejadian Sepsis Neonatorum**

Daftar Bacaan : 36 ( 2002 -2016)

NURSING FACULTY  
ANDALAS UNIVERSITY  
JULY, 2017

UNIVERSITAS ANDALAS

Name : Ricca Tami Febriyanti  
Reg. Number : 1311311073

**THE DESCRIPTIVE FACTORS OF *SEPSIS NEONATORUM* CASE  
THAT IS HAPPENED EARLIER TO THE BIRTH BABY  
IN PERINATOLOGY OF THE GOVERNMENT  
HOSPITAL DR. M.DJAMIL PADANG**

**ABSTRACT**

The infection that is happened earlier to the birth baby that cannot be cured cause the death. Sepsis neonatorum is one of the disease that is happening to the birth baby become one of the main problem that unsolve yet until now, WHO reports the *case fatality rate* to the sepsis neonatorum case is high about 40%. Sepsis neonatorum often undetection and cause the death. Based on The Indonesia Demography and Healthy Survey data in 2013 mention that the number of the death baby reach 32 and 40 per 1000 of the number of birth. The purpose of the research is to describe the factors of Sepsis Neonatorum that is happened earlier such as the age of the mother, kind of the birth, the mother's disease history, the antenatal history check up, the wight and pregnancy age. The reseach is a documentation study and the method applied is by gaining the sample called *total sampling*. The subject of the research is 80 baby that diagnose sepsis neonatorum at The Government Hospital Dr. M. Jamil, Padang. The research begin on february till july 2017. The instrument that is used is observation sheet, statistic experiment by doing *chi-square*. Based on the result gained, mother age down 20 years old and up 35 years old risk ( 58,8 % ), the kind of birth with measure (45%), the mother's disease history (63,8%), the antenatal unstable check up (53,8%), BBLR (47,5%) and the premature pregnancy (53,8%). Suggestion for the medical is to higher the efort of preventive by giving the education related to the mother's factors of the sepsis neonatorum.

**Keyword : The Factors That Influence, Sepsis Neonatorum**

Reading List : 36 ( 2002 -2016)

