

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “hubungan antara tahap kemoterapi dengan status gizi pada penderita Leukemia Limfoblastik Akut (LLA) di ruangan IRNA Kebidanan dan Anak RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2017”, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rata-rata umur anak yang menderita LLA adalah 8 tahun dari sebagian anak (60%) dengan jenis kelamin adalah perempuan.
2. Lebih dari sebagian anak dengan tahapan kemoterapi pada tahap maintenance /rumatan (minggu 13-62) yaitu sebanyak (56,7%).
3. Hampir sebagian anak dengan status gizi normal sebanyak (40%), lebih dari sebagian anak (60%) mengalami gangguan gizi (sangat kurus, kurus, gemuk dan obesitas)
4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tahap kemoterapi dengan status gizi pada penderita Leukemia Limfoblastik Akut (LLA) di ruangan IRNA Kebidanan dan Anak RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2017 ($p = 0,82 \geq 0.05$).

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan bagi institusi pendidikan dapat dijadikan data dasar atau data awal untuk penelitian lanjutan, dan sebagai penambah kepustakaan dan pengetahuan ilmiah mahasiswa keperawatan khususnya Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dalam bidang keperawatan anak.

2. Bagi Petugas Kesehatan

Diharapkan bagi petugas kesehatan terutama dokter dan perawat untuk dapat memberikan edukasi kepada orang tua dalam menjaga status gizi anak, dan melakukan pemantauan terhadap status gizi anak selama menjalani kemoterapi dan mempertahankan status gizi tersebut serta melakukan berbagai intervensi termasuk penanganan efek samping.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian tentang status gizi anak leukemia dengan memberikan intervensi atau tindakan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan status gizi anak selama menjalani kemoterapi.