

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan:

1. Insiden skizofrenia paling sering pada usia 26 – 35 tahun.
2. Angka kejadian skizofrenia pada laki – laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.
3. Tipe skizofrenia paling sering ditemui adalah skizofrenia tipe paranoid.
4. Pasien skizofrenia yang ada riwayat keluarga lebih sedikit disbanding dengan yang tidak ada riwayat keluarga.
5. Manifestasi klinis pasien skizofrenia yang paling sering hingga dibawa ke rumah sakit adalah gejala positif.
6. Sebagian besar pasien skizofrenia yang kami dapatkan berobat ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang dirawat inap.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pendidikan Kedokteran
 - a. Melakukan penelitian tentang skizofrenia dengan lebih komprehensif.
 - b. Menjadikan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya,

2. Bagi Instansi Kesehatan

- a. Pendataan data rekam medis untuk pasien skizofrenia dapat lebih ditingkatkan karena ada beberapa hal yang tidak tercatat.
- b. Melakukan edukasi, penyuluhan, dan cara penanggungan skizofrenia dapat dijadikan program rutin bagi rumah sakit terutama untuk ahli keluarga pasien skizofrenia.

3. Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang skizofrenia dan mengurangi stigma terhadap pasien skizofrenia.

