

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

a. Skala Nyeri Anak Kelompok Intervensi

Rata-rata skala nyeri pada kelompok intervensi adalah 2,60 (nyeri rendah).

b. Skala Nyeri Anak Kelompok Kontrol

Rata-rata skala nyeri pada kelompok kontrol adalah 6,60 (nyeri sedang).

c. Terhadap Skala Nyeri Anak Usia Sekolah yang Diberikan Terapi Distraksi: berdoa dengan Anak yang Tidak Diberikan Terapi Distraksi: berdoa

Terdapat pengaruh terapi distraksi: berdoa dengan skala nyeri anak kelompok kontrol.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Keperawatan

Agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai data dasar atau pedoman dalam memberikan intervensi terhadap anak yang mengalami nyeri saat dilakukan tindakan invasif.

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Memberikan terapi distraksi: berdoa saat akan melakukan tindakan pemasangan infus sebagai sarana untuk dapat mengurangi nyeri anak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terhadap terapi distraksi: doa dengan memperbanyak sampel dan lebih homogen seperti usia dan diagnosa medis. Dalam penggunaan skala nyeri *FLACC* agar dapat dipahami dengan yang lebih ahli sebelum digunakan.

