

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proporsi responden kasus TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil Padang Tahun 2016 ditemukan lebih tinggi pada responden yang status pekerjaannya wiraswasta, berstatus kawin, menderita anemia, pendidikan terakhir SMU, memiliki jumlah CD4 ≤ 200 cell/mm³ dan memiliki stadium 4 HIV/AIDS.
2. Tidak terdapat hubungan status pekerjaan dengan terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil tahun 2016.
3. Terdapat hubungan status perkawinan dengan terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil tahun 2016.
4. Terdapat hubungan kadar Hb dengan terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil tahun 2016.
5. Tidak terdapat hubungan tingkat pendidikan dengan terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil tahun 2016.
6. Tidak terdapat hubungan jumlah CD4 dengan terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil tahun 2016.
7. Tidak terdapat hubungan stadium HIV/AIDS dengan terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil tahun 2016.
8. Faktor yang paling dominan terhadap terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil tahun 2016 yaitu kadar Hb.

1.2 Saran

1. Bagi Pihak RSUP. Dr. M.Djamil Padang

- a. Diharapkan kepada RSUP. Dr. M. Djamil Padang bekerjasama lintas sektor dengan berbagai instansi terkait seperti, KPA, Rumah Sakit Puskesmas untuk dapat mengajak dan mengimbau masyarakat supaya menyadari pentingnya pola hidup bersih dan sehat dengan memberikan penyuluhan mengenai faktor risiko terjadinya penyakit TB pada penderita HIV/AIDS.
- b. Diharapkan kepada dokter dan perawat di RSUP. Dr. M. Djamil Padang untuk dapat memberikan konseling mengenai faktor risiko yang memicu terjadinya penyakit TB terhadap penderita HIV/AIDS dan pengaturan asupan nutrisi untuk dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada penderita HIV/AIDS.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambah variabel lain yang berpengaruh mengenai faktor risiko terjadinya TB pada penderita HIV/AIDS seperti status merokok, konsumsi alkohol, kontak dengan pasien TB, status sosial ekonomi dan kepemilikan rumah. Selain itu, data yang digunakan tidak hanya data sekunder tapi juga data primer serta melakukan observasi sehingga informasi tentang responden menjadi lebih lengkap.