

## V. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian didapatkan bahwasanya tidak ada interaksi antara luas lantai kandang dan level protein terhadap pertambahan bobot badan, konsumsi ransum dan konversi ransum dan juga luas lantai kandang memberikan pengaruh tidak nyata ( $P>0,05$ ) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum, namun pemberian level protein memberikan pengaruh sangat nyata ( $P<0,01$ ) terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi ransum. Luas kandang yang ekonomis dan menguntungkan adalah luas kandang A1 ( $60 \times 60 \text{ cm}^2$ ) atau  $0,072 \text{ m}^2/\text{ekor}$  serta pemberian protein terbaik adalah protein 23% yang dapat menurunkan konsumsi ransum, meningkatkan pertambahan bobot badan dan menurunkan konversi ransum.

### 5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan bagi pemelihara ayam broiler untuk menggunakan luas lantai kandang A1 ( $60 \times 60 \text{ cm}^2$ ) atau  $0,072 \text{ m}^2/\text{ekor}$  dan sebaiknya protein yang diberikan adalah 23%.

